

## **GEBRAUCHSINFORMATION**

### **WARNUNG: DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KINDER UND NICHTRAUCHER NICHT GEEIGNET!**

Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren, Kinder und Schwangere oder stillende Frauen. Personen mit Herz-Kreislaufkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Allergien gegen Propylenglycol, Glycerin, Nikotin oder Glucosurie. Das Produkt ist nicht geeignet für Personen mit Herz-, Kreislaufkrankungen oder Diabetes. Nicht geeignet für Personen die folgende Medikamente einnehmen: Antidepressiva, Asthma. Konsultieren Sie zur Beratung Ihren Arzt.

Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt nutzen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält, die Sie möglicherweise noch einmal benötigen.

### **ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UND LAGERUNG DES PRODUKTS:**

Achten Sie immer darauf, dass der Behälter vollständig verschlossen ist und aufrecht steht.

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 18-30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Das Produkt darf nicht gekühlt, eingefroren, erhitzt oder bei Temperaturen über 30°C gelagert werden.

### **MÖGLICHE KONTRAINDIKATIONEN:**

#### **Propylenglykol:**

- Kann unerwünschte Wirkungen hervorrufen bei Personen, die behandelt werden mit Disulfiram oder Metronidazol behandelt werden.
- Allergische Reaktionen können auftreten bei Personen mit einer Vorgeschichte von Atopie, Ekzemen in der Kindheit oder Rhinitis (Heuschnupfen).
- Eine Laktatazidose kann auftreten, wenn große Mengen von Propylenglykol Kindern, schwangeren Frauen
- Frauen oder Personen mit Leber- oder Nierenversagen.

#### **Glycerin:**

- Das Risiko einer Dehydrierung ist erhöht bei älteren und bereits dehydrierten Personen
- Vorsicht ist geboten bei Personen mit Diabetes, da metabolisiertes Glycerin eine leichte Hyperglykämie oder Glykosurie verursachen kann.

### **MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN:**

Bei Erstbenutzern von E-Zigaretten können Reizungen im Mund, ein trockener Hals oder Husten auftreten. Wenn die Symptome länger als 48 Stunden anhalten oder schwerwiegend werden, sollten Sie einen Hausarzt aufsuchen und die Einzelheiten des Vorfalls gemäß dem Leitfaden

"Meldung von unerwünschten Wirkungen" melden.

Nikotinentzugerscheinungen können auch auftreten, wenn Sie eine unzureichende Stärke verwenden, um Ihr Verlangen zu (lindern) befriedigen, wie z. B. Reizbarkeit, Aggressivität, Niedergeschlagenheit, Angstzustände, Unruhe, Konzentrationsschwäche, gesteigerter Appetit, Verlangen zu rauchen, Schlafstörungen oder eine Senkung der Herzfrequenz.

### **MELDUNG UNERWÜNSCHTER WIRKUNGEN:**

Wenn Sie infolge der Anwendung dieses Arzneimittels Nebenwirkungen feststellen, können Sie Ihre Sicherheitsbedenken bei der zuständigen Behörde Ihres Landes anmelden.

### **ABHÄNGIGKEIT:**

Dieses Produkt enthält Nikotin, eine stark süchtig machende Substanz, und wird daher nicht für den Gebrauch durch Nichtraucher empfohlen. Abgesehen von Nikotin ist kein anderer Bestandteil dieses Produkts als süchtig machend bekannt.

### **GIFTIGKEIT:**

Dieses Produkt enthält Nikotin, das bei oraler Einnahme toxische Wirkungen haben kann, insbesondere bei Säuglingen und Kindern. Trinken Sie dieses Produkt NICHT. Bei Verschlucken sofort den Hausarzt mit diesem Handbuch aufsuchen. Bei Verschütten auf die Haut sofort mit kaltem Wasser abspülen und 10-15 Minuten einwirken lassen.



Drücken Sie die Verschlusskappe nach unten und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Flasche zu öffnen.



Führen Sie die Spitze (1,8 - 2,6mm Durchmesser) in die Befüllöffnung des Tanks.



Zum Befüllen Ihres Tank, drücken sich leicht auf die Flasche.



Entfernen Sie die Spitze aus der Befüllöffnung und verschließen Sie die Flasche vollständig.